

Systeemisten ihopsoriaasilääkkeiden sopivuus eri hoitolanteissa

	Nivelpsoriaasi	Crohnin tauti	Colitis ulcerosa	Sydämen vajaatoiminta (NYHA III-IV)	Valtimoautti	MS	Latentti tuberkuloosi	HIV	Masennus/itsemurhaliuks	Metabolinen oireyhtymä	Rasvamaksa	Munuaisten vajaatoiminta (lievä tai keskivaikea)
IL12/23-estäjä Ustekinumabi	+	++	++	+	+	+	?*	+	+	++	+	+
IL17-estäjät Brodalumabi Iksekitsumabi Sekukinumabi	?	-	-	+	+	+	+	?	?	++	+	+
IL23-estäjät Guselkumabi Risankitsumabi Tildrakitsumabi	?	+	+	+	+	+	+	?	+	++	+	+
TNF-estäjät Adalimumabi Etanersepti Infiksimabi Sertolitsumabipegoli	++	++	++	-	++	-	-	+	+	+	+	+
Oraaliset lääkkeet Apremilasti Asitretiini Dimetylifumaraatti Metotreksaatti Siklosporiini	+	+	+	+	+	?	+	+	-	+	-	+

*IGRA-positiivisille suositellaan latentin tuberkuloosin estohoittoa

- ++ Suositeltu vaihtoehto
- + Voidaan käyttää
- ? Liian vähän tai ristiriitaista tietoa
- Ei suositella