



TAULUKKO 5. Potilaan riskiluokka ilmentää parodontiitin etenemisnopeutta huomioiden mahdolliset riskitekijät taudin etenemiselle / puutteelliselle hoitovasteelle.

	Luokituksen primaarikriteerit		Luokitusta modifioivat tekijät	
Potilaan riskiluokitus	Kiinnitys- tai luukato edeltävän 5 vuoden aikana *	% luukato / ikä **	Tupakointi***	Diabetes***
Luokka A: Hidas taudin eteneminen	Ei havaittavissa	< 0,50	Savuttomuus	Ei-diabeetikko / Normoglykeeminen potilas (HbA1c < 6,5 %)
Luokka B: Kohtalainen taudin eteneminen	< 2 mm	0,50–1,0	Tupakointi (< 10 savuketta / vrk)	Diabeetikko (HbA1c < 7,0 %)
Luokka C: Nopea taudin eteneminen	≥ 2 mm	> 1,0	Tupakointi (≥ 10 savuketta / vrk)	Diabeetikko (HbA1c ≥ 7,0 %)

* = luokitus määritetään ensisijaisesti kiinnitys- tai luukadon mukaan, kun ko. tieto on saatavilla (suora näyttö taudin etenemisestä)

** = määritetään hampaasta, jossa eniten radiologista luukatoa (epäsuora näyttö taudin etenemisestä)

*** = tupakointi ja diabetes voivat nostaa primaarikriteerein määritettyä riskiluokkaa, joten tupakoinnin määrä ja pitkäaikaisverenokeriarvo (HbA1c) huomioidaan riskiluokan määrittämisessä

Lähteet: Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N ym. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S162-S170; Dietrich T, Ower P, Tank M ym. Br Dent J 2019;226:16-22