


AVANCERAD HJÄRT-LUNGRÄDDNING PÅ EN VUXEN



Suomen
Elvytysneuvosto



Fortsätt med högkvalitativa bröstkompressioner

- Ge extra syre
- Följ kapnografikurvan
- Fortsätt med bröstkompressioner när luftvägarna säkrats
- Minimera avbrott i kompressionerna
- Öppna en kärlförbindelse (IV/IO)
- Ge adrenalin med 3–5 minuters mellanrum
- Ge amiodaron efter tre defibrilleringar
- Identifiera och behandla orsaker som kan behandlas

Identifiera och behandla orsaker som kan behandlas

- Hypoxi
- Hypovolemi
- Hypo-/hyperkalemi/annan metabolisk orsak
- Hypo-/hypertermi
- Trombos (kransartärer/lungartär)
- Tensionspneumothorax (övertryckpneumothorax)
- Tamponad (perikardiell tamponad)
- Toxiner (förgiftningar)

Överväg ultraljudsundersökning som hjälp för identifiering

Överväg i specialsituationer eller patientspecifikt

- Mekaniska kompressioner på grund av transport eller en behandlingsbar orsak
- ECMO/koronarangiografi/PCI

Omedelbar vård efter hjärt-lungräddning

- Bedöm ABCDE
- Sträva efter SpO₂ 94–98 % och normokapni
- Ta en EKG med 12 avledningar
- Behandla orsaken till hjärtstopp
- Följ upp temperaturen