

Suuren riskin glaukoomapotilaan tyypillisiä tunnusmerkkejä

- Nopeasti etenevät tautimuutokset riippumatta silmänpainetasosta
- Lähtöpaine yli 30–35 mmHg ja selvät papilla-, hermosäie- ja näkökenttävauriot¹
- Vahva sukurasisitus
 - useilla sukulaisilla glaukooma, joka on ilmaantunut nuorella iällä ja/tai aiheuttanut näkövammaisuutta
- Muita riskitekijöitä edellisten lisäksi, esim. eksfoliaatio ([Taulu 2](#))

Hoito- ja seurantasuositus suuren riskin glaukoomapotilaille

- Paineen tehokas alentaminen
 - Korkeapaineisilla < 15–20 mmHg:iin, mieluiten lähelle 10 mmHg:ä, matalammilla painetasoilla ≥ 35 %:n paineen lasku
 - Yksi lääke (tai laserhoito yksinään) ei riitä
 - On syytä ryhtyä hyvin herkästi leikkaushoitoon
- Tiheä seuranta
 - Painetasosta riippuen jopa päivittäin tai viikoittain (kuukausittain), kunnes paine on laskenut tai eteneminen on saatu pysähtymään.

¹ Varmistettava gonioskopialla, ettei kyseessä ole ahdas kammiokulma.