


Päivystyksellisen pään TT-tutkimuksen indikaatiot pään vamman jälkeen

(Head injury: assessment and early management. National Institute for Health and Care Excellence; 2023)

Kaavio | 20.12.2023

Pään vamman saanut aikuispotilas (vähintään 16 vuotias) ensiavussa



* Merkki kallonpohjan murtumasta:

- Hemotympanum
- Periorbitaalinen hematooma (brillen-hematooma)
- Subkutaaninen hematooma mastoideuslokeroston päällä (Battle's sign)
- Likvorivuoto nenästä tai korvasta

** Hyytymishäiriö:

- Maksan vajaatoiminta
- Hemofilia
- Antikoagulanttilääkitys
- Verihiutaleiden estäjälääkitys

*** Vaarallinen vammamekanismi:

- Jalankulkija tai pyöräilijä joutunut moottoroidun ajoneuvon töytäisemäksi
- Henkilö lentänyt ulos ajoneuvosta
- Putoaminen yli 1 metrin tai yli 5 portaan korkeudesta

**** Retrogradinen amnesia:

- Muistamattomuus vammaa edeltäneistä tapahtumista

GCS = Glasgow Coma Scale, Glasgow'n kooma-asteikko

DOAC = direct oral anticoagulant, suora antikoagulantti

LMWH = low molecular weight heparin, pienimolekyylinen hepariini