


Suositus glaukooman hoitosuunnitelmasta

Aloitetaanko hoito vai seurataanko ilman hoitoa?

Huomioitava hoidon aloitusta harkittaessa


- potilaan ikä ja odotettavissa oleva elinikä
- taudin vaikeusaste (molemmat silmät)
- etenemisnopeus: kuinka nopeasti muutokset ovat ilmaantuneet
- silmänpaine: millä painetasolla vauriot ovat syntyneet
- riskitekijät
- potilaan muut (silmiä)sairaudet, lääkitykset ja allergiat sekä mahdollinen raskaus*

Hoito päätetään aloittaa



- Hoitava lääkäri valitsee aloitushoidon.
- Jos lääkkeelle ei vastetta → vaihda toiseen, tarvittaessa yhdistä.
- Yhdestä lääkeryhmästä vain yksi lääkeaine kerrallaan.
- Harkitse vakavasti, jos haluat lisätä lääkitykseen kolmannen pullon.
- Huomioi mahdollinen paine- ja kaihileikkauksen tarve.

Ei (riittävästi) vastetta tai edelliset eivät sovi tai muutokset etenevät alentuneesta painetasosta huolimatta



Silmäkirurgi valitsee leikkaustyyppin.

* Useimpia lääkkeitä ei voida käyttää raskauden aikana. Beetasalpaaja ja pilokarpiini ovat mahdollisia. Neuvottele aina lääkityksestä raskautta hoitavan lääkärin kanssa.

** Oraalinen valmiste yleensä väliaikaiseen käyttöön.