

19.9.2017

Valmistelu: maapähkinät kuoritaan ja jauhetaan teholeikkurilla. Annokset punnitaan lääkelaseihin.

<b>Avoin</b> <b>maapähkinäallistus</b>	Nimi	Lähettävä lääkäri
	Henkilötunnus	Valvova lääkäri
Aloituspvm		Hoitaja
Maapähkinän aiheuttamaksi epäilty oire:		
Lähtötilanne ennen altistusta :		
Pituus (cm):	Paino (kg):	


Altistuksessa maapähkinää annetaan 30 minuutin välein oireita seuraten. Viimeisen annoksen jälkeen lapsen vointia seurataan 2 tuntia. Jos Ara h2 > 0,35, altistusprotokolla muutetaan 6 portaiseksi lisäten siihen 100 mg ja 400 mg annokset.

		Määrä	20 mg =1/40	100 mg =1/8	200 mg =1/4	800 mg =1 kpl	2 g =2,5 kpl		
		Klo							
I. IHO	A. Ihottuma	% ihosta							
		B. Kutina	1 = Ajoittaista raapimista						
			2 = Raapimista > 2min kerrallaan						
	3 = Kovaa jatkuvaa raapimista								
	C. Urtikaria	1 = < 3 paukamaa, lievä huulen turvotus							
		2 = 3-10 paukamaa, merkittävä huulen tai kasvojen turvotus							
		3 = Yleistynyt urtikaria							
	D. Ihottuma	1 = Muutamia vaaleita alueita							
		2 = Ihottuma-alueita							
		3 = Ihottumaa > 50 % ihosta							
II. YLEMMÄT HENGITYSTIET	A. Nuha	1 = Satunnaista niiskutusta ja aivastuksia							
		2 = Tiheä niiskutus, < 10 aivastusta, nenän tai silmien hankaus ajoittain							
		3 = Jatkuva aivastelu, nenän tai silmien hankaus, turvotus ja vuoto							
III. ALEMMAT HENGITYSTIET	A. Astma	1 = Uloshengitysvinkunoita auskultaatiossa							
		2 = Ulos- ja sisäänhengitysvinkunoita auskultaatiossa							
		3 = Kuuluvat vinkunat, apuhengityslihakset käytössä							
	B. Larynks	1 = > 3 kurkun selvittelyä tai yskimistä, jatkuva kurkun turvotus tai kipu							
		2 = Käheys, kuivaa yskää							
		3 = Stridor							
IV. SUOLISTO	A. Subjekttiivinen	1 = Pahoinvointi, mahakipu, suun tai nielun kutina							
		2 = Jatkuva pahoinvointi tai mahakipu, yleistila hyvä							
		3 = Tuskaiset suolioireet, väsähtäneisyys							
	B. Objekttiivinen	1 = 1 oksennus tai ripuli							
		2 = 2-3 oksennusta tai ripulia tai 1 kumpaakin							
		3 = > 3 oksennusta tai ripulia tai 2 kumpaakin							
V. KARDIOVASKULAARINEN JA NEUROLOGINEN		1 = Heikotus, huimaus, takykardia							
		2 = > 20 % lasku verenpaineessa, sekavuus							
		3 = Kardiovaskulaarinen kollapsi, tajuttomuus							
		YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0	


	Vihreä ruutu: altistusta jatketaan
	Oranssi ruutu: voidaan edetä, pidentää annosväliä tai toistaa sama annos; 3 oranssia ruutua merkinä todellisesta reaktiosta ja altistus voidaan lopettaa
	Punainen ruutu: objektiiviset oireet merkinä todellisesta reaktiosta ja altistus lopetetaan (1 punainen ruutu riittää)

19.9.2017

Ennen altistusta



Altistuksen jälkeen



Pinta-alat  
etu + taka (alle 2v)  
Pää 4,5 + 4,5 % (8,5 + 8,5 %)  
Kädet 4,5 + 4,5 % (4,5 + 4,5 %)  
Vartalo 18 + 18 %  
Jalat 9 + 9 % + 9 + 9 % (9 + 6 % + 9 + 6 %)  
Genitaalit 1 %