



TAULUKKO 4. Parodontiitin vaiheen määrittäminen.

Parodontiitin vaihe	Erityispiirteet	Kliiniset löydökset				Radiologiset löydökset
		lenverenvuoto (BOP %)	Taskusyvytydet	Kiinnityskato	Puuttuvat hampaat [‡]	Luukato
alkava (I-vaihe)	Lähinnä horisontaalista luukatoa	+	4 mm	1–2 mm	0	juuren koronaalikalmanne (< 15 %*)
keskivaihe (II-vaihe)	Lähinnä horisontaalista luukatoa	+	4–5mm	3–4 mm	0	juuren koronaalikalmanne (15–33 %*)
vaikea (III-vaihe)	Edellisen lisäksi: <ul style="list-style-type: none"> • vertikaalista luukatoa ≥ 3 mm • FII-III furkaatiovauriot • kohtalaiset vauriot alveoli-harjanteella 	+	≥ 6 mm	≥ 5 mm	1–4	juuren keski- tai apikaalikalmanne
pitkälle edennyt (IV-vaihe)	Edellisen lisäksi vähintään yksi seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> • heikentynyt purentakyky • hampaiden lisääntynyt liikkuvuus (2.-3. aste) • merkittävät alveoli-harjanteen vauriot • hampaiden asentomuutokset (viihkaantumisen, purenta-romahdus) • jäljellä < 10 purentaparia 	+	≥ 6 mm	≥ 5 mm	≥ 5	juuren keski- tai apikaalikalmanne

* = prosentuaalinen osuus juuren pituudesta

‡ = parodontiitin vuoksi menetettyjen hampaiden lukumäärä

Lähteet: Tonetti MS, Greenwell H, Kornman KS. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S149-S161; Trombelli L, Farina R, Silva CO ym. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S44-S67; Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N ym. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S162-S170; Berglundh T, Armitage G, Araujo MG ym. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S286-S291; Renvert S, Persson GR, Piri FQ ym. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S278-S285; Chapple ILC, Mealey BL, Van Dyke TE ym. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S68-S77; Fine DH, Patil AG, Loos BG. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S95-S111