

Taulukko 5. Potilaan riskiluokka ilmentää parodontiitin etenemisnopeutta huomioiden mahdolliset riskitekijät taudin etenemiselle / puutteelliselle hoitovasteelle.

Potilaan riskiluokitus	Luokituksen primaarikriteerit		Luokitusta modifioivat tekijät	
	Kiinnitys- tai luukato edeltävien 5 vuoden aikana*	% luukato/ikä**	Tupakointi***	Diabetes***
Luokka A: Hidas taudin eteneminen	Ei havaittavissa	< 0,50	Savuttomuus	Normoglykeeminen potilas (HbA1c < 6,5 %, < 47 mmol/mol)
Luokka B: Kohtalainen taudin eteneminen	< 2 mm	0,50–1,0	Tupakointi (< 10 savuketta/vrk)	Diabetesta sairastava potilas (HbA1c < 7,0 %, < 53 mmol/mol)
Luokka C: Nopea taudin eteneminen	≥ 2 mm	> 1,0	Tupakointi (≥ 10 savuketta/vrk)	Diabetesta sairastava potilas (HbA1c ≥ 7,0 %, ≥ 53 mmol/mol)
* luokitus määritetään ensisijaisesti kiinnitys- tai luukadon mukaan, kun ko. tieto on saatavilla (suora näyttö taudin etenemisestä)				
** määritetään hampaasta, jossa eniten röntgenologista luukatoa (epäsuora näyttö taudin etenemisestä)				
*** tupakointi ja diabetes voivat nostaa primaarikriteerein määritettyä riskiluokkaa, joten tupakoinnin määrä ja pitkäaikaisverensokeriarvo (HbA1c) huomioidaan riskiluokan määrittämisessä				

Lähteet:

Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N, ym. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S162-S170

Dietrich T, Over P, Tank M, ym. Periodontal diagnosis in the context of the 2017 classification system of periodontal diseases and conditions - implementation in clinical practice. Br Dent J 2019;226(1):16-22