

		Määrä	1,5 mg	6,0 mg	25 mg	100 mg	500 mg
		Klo					
I. IHO	A. Ihottuma	% ihosta					
	B. Kutina	1 = Ajoittaista raapimista					
		2 = Raapimista >2min kerrallaan					
		3 = Kovaa jatkuvaa raapimista					
	C. Urtikaria	1 = < 3 paukamaa, lievä huulen turvotus					
		2 = 3-10 paukamaa, merkittävä huulen tai kasvojen turvotus					
		3 = Yleistynyt urtikaria					
	D. Ihottuma	1 = Muutamia vaaleita alueita					
		2 = Ihottuma-alueita					
		3 = Ihottumaa > 50 % ihosta					
II. YLEMMÄT HENGITYSTIET	A. Nuha	1 = Satunnaista niiskutusta ja aivastuksia					
		2 = Tiheä niiskutus, < 10 aivastusta, nenän tai silmien hankaus ajoittain					
		3 = Jatkuva aivastelu, nenän tai silmien hankaus, turvotus ja vuoto					
III. ALEMMAT HENGITYSTIET	A. Astma	1 = Uloshengitysvinkunoita auskultaatiassa					
		2 = Ulos- ja sisäänhengitysvinkunoita auskultaatiassa					
		3 = Kuuluvat vinkunat, apuhengitysilhakset käytössä					
	B. Larynx	1 = > 3 kurkun selvittelyä tai yskimistä, jatkuva kurkun turvotus tai kipu					
		2 = Käheys, kuivaa yskää					
		3 = Stridor					
IV. SUOLISTO	A. Subjekttiivinen	1 = Pahoinvointi, mahakipu, suun tai nielun kutina					
		2 = Jatkuva pahoinvointi tai mahakipu, yletila hyvä					
		3 = Tuskaiset suolioireet, väsähtäneisyys					
	B. Objekttiivinen	1 = 1 oksennus tai ripuli					
		2 = 2-3 oksennusta tai ripulia tai 1 kumpaakin					
		3 = > 3 oksennusta tai ripulia tai 2 kumpaakin					
V. KARDIOVASKULAARINEN JA NEUROLOGINEN		1 = Heikotus, huimaus, takykardia					
		2 = > 20 % lasku verenpaineessa, sekavuus					
		3 = Kardiovaskulaarinen kollapsi, tajuttomuus					
		YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

	Vihreä ruutu: altistusta jatketaan
	Oranssi ruutu: voidaan edetä, pidentää annosväliä tai toistaa sama annos; 3 oranssia ruutua merkinä todellisesta reaktiosta ja altistus voidaan lopettaa
	Punainen ruutu: objektiiviset oireet merkinä todellisesta reaktiosta ja altistus lopetetaan (1 punainen ruutu riittää)