

8.1.2015

Valmistelu: kala (esimerkiksi lohi tai pakasteseiti) kypsennetään keittämällä ja pakastetaan 20 g annoksina. Pakastettu kala sulatetaan, ja siitä punnitaan altistusannokset kannellisiin lääkelaseihin. Säilytetään jääkaapissa.

**Avoin kala-altistus**

Nimi	Lähetävä lääkäri
Henkilötunnus	Valvova lääkäri
Aloituspvm	Hoitaja

**Proteiinia noin 20 g / 100 g**


Kalan aiheuttamaksi epäilty oire:
Lähtötilanne ennen altistusta:
Pituus (cm):                      Paino (kg):

Altistuksessa kalaa annetaan 30 minuutin välein oireita seuraten. Viimeisen annoksen jälkeen lapsen vointia seurataan 2 tuntia.


		Määrä	50 mg	500 mg	5 g	10 g		
		Klo						
I. IHO	A. Ihottuma	% ihosta						
		B. Kutina	1 = Ajoittaista raapimista					
			2 = Raapimista > 2min kerrallaan					
	3 = Kovaa jatkuvaa raapimista							
	C. Urtikaria	1 = < 3 paukamaa, lievä huulen turvotus						
		2 = 3-10 paukamaa, merkittävä huulen tai kasvojen turvotus						
		3 = Yleistynyt urtikaria						
	D. Ihottuma	1 = Muutampia vaaleita alueita						
		2 = Ihottuma-alueita						
		3 = Ihottumaa > 50 % ihosta						
II. YLEMMÄT HENGITYSTIET	A. Nuha	1 = Satunnaista niiskutusta ja aivastuksia						
		2 = Tiheä niiskutus, < 10 aivastusta, nenän tai silmien hankaus ajoittain						
		3 = Jatkuva aivastelu, nenän tai silmien hankaus, turvotus ja vuoto						
III. ALEMMAT HENGITYSTIET	A. Astma	1 = Uloshengitysvinkunoita auskultaatiassa						
		2 = Ulos- ja sisäänhengitysvinkunoita auskultaatiassa						
		3 = Kuuluvat vinkunat, apuhengitysvinkunat käytössä						
	B. Larynks	1 = > 3 kurkun selvittelyä tai yskimistä, jatkuva kurkun turvotus tai kipu						
		2 = Käheys, kuivaa yskää						
		3 = Stridor						
IV. SUOLISTO	A. Subjekttiivinen	1 = Pahoinvointi, mahakipu, suun tai nielun kutina						
		2 = Jatkuva pahoinvointi tai mahakipu, yleistila hyvä						
		3 = Tuskaiset suolioireet, väsähtäneisyys						
	B. Objekttiivinen	1 = 1 oksennus tai ripuli						
		2 = 2-3 oksennusta tai ripulia tai 1 kumpaakin						
		3 = > 3 oksennusta tai ripulia tai 2 kumpaakin						
V. KARDIOVASKULAARINEN JA NEUROLOGINEN	1 = Heikotus, huimaus, takykardia							
	2 = > 20 % lasku verenpaineessa, sekavuus							
	3 = Kardiovaskulaarinen kollapsi, tajuttomuus							
YHTEENSÄ			0	0	0	0	0	

	Vihreä ruutu: altistusta jatketaan
	Oranssi ruutu: voidaan edetä, pidentää annosväliä tai toistaa sama annos; 3 oranssia ruutua merkinä todellisesta reaktiosta ja altistus voidaan lopettaa
	Punainen ruutu: objektiiviset oireet merkinä todellisesta reaktiosta ja altistus lopetetaan (1 punainen ruutu riittää)

Ennen altistusta



Altistuksen jälkeen



Pinta-alat  
etu + taka (alle 2v)  
Pää 4,5 + 4,5 % (8,5 + 8,5 %)  
Kädet 4,5 + 4,5 % (4,5 + 4,5 %)  
Vartalo 18 + 18 %  
Jalat 9 + 9 % + 9 + 9 % (9 + 6 % + 9 + 6 %)  
Genitaalit 1 %