


Atrofinen gastriitti

- Gastroskopiassa otetaan kahdet koepalat antrumista (vähintään 3 cm pyloruksesta) **ja** korpuksesta (pienestä ja suuresta kaarroksesta).
- Jos halutaan käyttää OLGA/OLGIM-luokitusta pitää ottaa myös koepala Anguluksesta (kts alla).
- Helikobakteeri häädetään, mikäli on positiivien.
- Kontrolliskopiat tehdään mahdollisuuksien muka HD skoopilla ja käytetään NBI:tä (tai kromoendoskopiaa).
- Mikäli todetaan atrofia B12-vitamiini kannattaa kertaalleen kontrolloida

Atrofisen gastriitin seuranta (potilaille, jotka ovat toimenpidekelpoisia):



IM; intestinaalinen metaplasia

HD-CE; High definition chromoendoscopy

OLGA/OLGIM Stage III/IV pitäisi seurata gastrokopiolla 3 vuoden välein

OLGA:

Atrofia pisteytys		Korpus			
		Ei atrofia (score 0)	Lievä atrofia (score 1)	Keskivaikea atrofia (score 2)	Vaikea atrofia (score 3)
Antrum+ Angulus	Ei atrofia (score 0)	Stage 0	Stage I	Stage II	Stage II
	Lievä atrofia (score 1)	Stage I	Stage I	Stage II	Stage III
	Keskivaikea atrofia (score 2)	Stage II	Stage II	Stage III	Stage IV
	Vaikea atrofia (score 3)	Stage III	Stage III	Stage IV	Stage IV

OLGIM:

Intestinaalisen metaplasian (IM) pisteytys		Korpus			
		Ei IM (score 0)	Lievä IM (score 1)	Keskivaikea IM (score 2)	Vaikea IM (score 3)
Antrum+ Angulus	Ei IM (score 0)	Stage 0	Stage I	Stage II	Stage II
	Lievä IM (score 1)	Stage I	Stage I	Stage II	Stage III
	Keskivaikea IM (score 2)	Stage II	Stage II	Stage III	Stage IV
	Vaikea IM (score 3)	Stage III	Stage III	Stage IV	Stage IV